

MÔ TẢ MỘT LOÀI CÁ MỚI TRONG GIỐNG *Anabas* Cloquest, 1816 ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở NINH BÌNH

Nguyễn Văn Hảo, Ngô Sỹ Vân, Nguyễn Thị Diệu Phương

TÓM TẮT

Giống cá Rô đồng *Anabas* Cloquest, 1816 (họ Anabantidae, bộ Perciformes) cho tới nay chỉ thấy có 2 loài là *A. testudineus* (Bloch, 1795), phân bố rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới và loài *A. cobojius* (Hamilton, 1822) phân bố ở Ấn Độ, Bangladesh và Borneo Indonesia. Ở nước ta chỉ có 1 loài là *A. testudineus* (Bloch, 1795) phân bố rộng rãi trong cả nước. Loài mới *A. tongtruongensis* sp.n. được mô tả dựa vào mẫu thu ở các vực nước vùng núi đá vôi thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Loài mới này khác với 2 loài trên là: Khởi điểm vây lưng ở sau và trên gốc sau vây ngực. Miệng hẹp và xiên xuống hơn; rạch miệng gần tới viền trước mắt. Răng trên xương lá mía hình cung nông, giữa hơi có góc, giải răng rộng và không đều, giữa to rộng và hai mút nhỏ nhọn; khoảng cách hai bên mút bằng $\frac{3}{4}$ đường kính mắt. Lưỡi nhỏ hẹp và dày, mút tỳ hơi nhọn và hình tam giác. Đường bên có $L.1 = 28 \frac{3,5}{9 - 10 - A}$ 32 vảy, chia 2 đoạn trước sau và không có vảy gối nhau. Đốt sống 24-25 chiếc.

Từ khóa: *Perciformes*, *Anabantidae*, giống *Anabas*, loài mới, Ninh Bình, Việt Nam.