

ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA BÀO NGƯ CHÍN LỖ (*Haliotis diversicolor* Reeve, 1846) TẠI VÙNG BIỂN CÔ TÔ, QUẢNG NINH

Đỗ Anh Duy, Trần Văn Hường

TÓM TẮT

Kết quả điều tra, nghiên cứu tại 36 trạm khảo sát tại vùng biển Cô Tô, Quảng Ninh cho thấy, bào ngư chín lỗ phân bố không đều, mật độ thấp, trung bình chỉ đạt 1,31 cá thể/ 500 m². Tần suất nhóm chiều dài bắt gặp 1,5 - 5,0 cm, trong đó nhóm chiều dài 3,5 - 4,5 cm chiếm ưu thế. Địa hình nền đáy đá vôi rất thích hợp cho phân bố của bào ngư. Tỷ lệ bắt gặp bào ngư phân bố trong kiểu nền đáy này chiếm tới 90%, trong khi đó khu vực nền đáy đá tảng chỉ chiếm 10%. Khu vực sườn dốc rạn bắt gặp bào ngư phân bố nhiều nhất, chiếm đến 80% cá thể; khu vực chân rạn chiếm 20%. Khoảng độ sâu phân bố phổ biến là 3 - 8 m so với mực triều thấp nhất với mật độ trung bình bắt gặp 4,3 - 4,5 cá thể/ 500 m². Khu vực phân bố chủ yếu của bào ngư chín lỗ tại vùng biển Cô Tô là từ bãi đá Cầu My đến bãi đá Móng Rồng; bãi đá Dựng; phía nam hòn Đông Nam (hòn Khe Trâu); phía đông bắc đảo Cô Tô lớn; phía đông đảo Cô Tô con; phía nam xã Thanh Lân; phía đông xã Thanh Lân; đông bắc xã Thanh Lân và khu vực phía đông hòn Ba Đỉnh (hòn Miếu).

Từ khoá: Bào ngư chín lỗ, mật độ, phân bố, tần suất, *Haliotis diversicolor*, Cô Tô, Quảng Ninh.