

# KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, SINH LÝ RA HOA, ĐẬU QUẢ CỦA GIỐNG BƯỞI XUÂN VÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Vi Xuân Học, Nguyễn Quốc Hùng,  
Nguyễn Văn Vượng, Trần Thị Nhung

## TÓM TẮT

Với mục đích xây dựng căn cứ khoa học để tác động các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng bưởi Xuân Vân, những nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng, sinh lý ra hoa, đậu quả đã được tiến hành tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang trong các năm 2015-2016. Tương tự các giống bưởi khác, giống bưởi Xuân Vân ở thời kỳ chưa có quả thường có 4 đợt lộc, song ở thời kỳ cho quả thường chỉ có 3 đợt lộc: xuân, hè và lộc thu. Các thời điểm xuất hiện, kết thúc các đợt lộc của bưởi Xuân Vân thường sớm hơn bưởi Diễn. Trong các đợt lộc, số lượng lộc xuân nhiều nhất; số lượng lộc thu nhiều hơn lộc hè. Sự phân hóa mầm hoa của bưởi Xuân Vân thường diễn ra từ trước tháng 12 và kéo dài trong khoảng 20 - 27 ngày, tương tự như bưởi Diễn, song thời điểm nở hoa của bưởi Xuân Vân thường sớm hơn bưởi Diễn trong cùng điều kiện sinh thái. Thời kỳ rụng quả sinh lý của bưởi Xuân Vân diễn ra sau tắt hoa từ 5 -7 ngày và kéo dài trong khoảng gần 2 tháng (từ nửa đầu tháng 3 đến nửa đầu tháng 5). Tốc độ tăng trưởng của quả tập trung ở giai đoạn 45 - 60 ngày sau rụng quả sinh lý. Thời điểm thu hoạch của bưởi Xuân Vân sớm hơn bưởi Diễn, thường vào cuối tháng 9, đầu tháng 10.

**Từ khoá:** *Bưởi Xuân Vân, đặc điểm sinh trưởng, sinh lý ra hoa, tỉnh Tuyên Quang.*

**Người phản biện:** GS.TS Vũ Mạnh Hải

**Ngày nhận bài:** 20/10/2017

**Ngày thông qua phản biện:** 20/11/2017

**Ngày duyệt đăng:** 27/11/2017