

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MÙA CHÁY RỪNG Ở CÁC VÙNG SINH THÁI TỈNH QUẢNG BÌNH

Nguyễn Phương Văn

TÓM TẮT

Sử dụng phương pháp chỉ số khô hạn của Thái Văn Trùng và phương pháp lượng mưa trung bình tuần trong nhiều năm liên tục để xác định mùa cháy là chưa phù hợp với điều kiện của từng vùng sinh thái. Kết quả áp dụng phương pháp thống kê đa biến với các biến là yếu tố khí tượng (P, H, T, dT, S) để xác định mùa cháy rừng cho thấy, các tháng 2, 3 và tháng 4 là các tháng tiếp cận mùa khô; 9 là tháng tiếp cận mùa mưa; trọng tâm các tháng khô hạn ở các vùng sinh thái gồm tháng 5, 6, 7 và 8. Đây là cơ sở để xây dựng các giải pháp phòng, chống cháy cho từng vùng sinh thái cụ thể của tỉnh Quảng Bình.

Từ khóa: *Yếu tố khí tượng, mùa cháy rừng, phương pháp thống kê đa biến, vùng sinh thái.*

Người phản biện: PGS.TS. Bế Minh Châu

Ngày nhận bài: 16/7/2018

Ngày thông qua phản biện: 17/8/2018

Ngày duyệt đăng: 24/8/2018

