

ĐẶC ĐIỂM CÂY TRỘT BÀN KHÔNG CÁNH (*Sonneratia apetala* Buch-Ham) Ở VÙNG VEN BIỂN BẮC BỘ VÀ BẮC TRUNG BỘ, VIỆT NAM

**Lê Văn Thành, Đỗ Thị Kim Nhung,
Phạm Ngọc Thành, Trần Văn Cao, Nguyễn Khắc Hiếu**

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định tiêu chí chọn lọc cây trột Bàn không cánh ở vùng ven biển Bắc bộ và Bắc Trung bộ thông qua điều tra và đánh giá các cây được chọn trong các ô tiêu chuẩn có số lượng cây Bàn không cánh ≥ 6 tuổi. Kết quả điều tra, đánh giá đã chọn được 2 lâm phần (cồn Dải Áo và cồn Đồng Bào) trồng Bàn không cánh có tuổi ≥ 6 tuổi (đảm bảo khả năng cung cấp giống) với số lượng cây trồng trên mỗi lâm phần đủ lớn tại xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Trong đó, cồn Đồng Bào chọn được 34 cây trột, cồn Dải Áo chọn được 12 cây trột đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn cây trột.

Từ khóa: *Bàn không cánh (Sonneratia apetala Buch-Ham), cây trột, rừng ngập mặn, sinh trưởng.*

Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa

Ngày nhận bài: 6/7/2018

Ngày thông qua phản biện: 8/8/2018

Ngày duyệt đăng: 15/8/2018