

# **ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP GHEP ĐẾN TỶ LỆ SỐNG VÀ TỶ LỆ XUẤT VƯỜN CỦA BƯỞI ĐỎ TÂN LẠC VÀ BƯỞI DA XANH TẠI THÁI NGUYÊN**

**Hà Duy Trường, Đặng Tố Nga, Hà Minh Tuấn, Lê Trường Giang**

## **TÓM TẮT**

Nghiên cứu được thực hiện vụ xuân hè 2018 tại Thái Nguyên trên hai giống bưởi đỏ Tân Lạc và bưởi da xanh với 3 công thức tương ứng với 3 phương pháp ghép: công thức 1: ghép mắt nhỏ có gỗ không cắt ngọn; công thức 2: ghép mắt nhỏ có gỗ cắt ngọn; công thức 3: ghép nêm. Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp ghép có ảnh hưởng đến tỷ lệ bật mầm, tỷ lệ sống và tỷ lệ xuất vườn của cả hai giống bưởi đỏ Tân Lạc và bưởi da xanh. Trong đó công thức ghép mắt nhỏ có gỗ cắt ngọn cho tỷ lệ cây bật mầm và tỉ lệ sống cao nhất, đạt 90%. Ngoài ra, phương pháp ghép cũng ảnh hưởng rõ rệt tới khả năng sinh trưởng của mầm ghép: công thức ghép mắt nhỏ có gỗ cắt ngọn đạt kết quả cao nhất với tỉ lệ xuất vườn từ 70,0% (với giống bưởi đỏ Tân Lạc) và 73,8% với giống bưởi da xanh.

*Từ khóa: Bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Da Xanh, kiểu ghép, tỷ lệ sống, sinh trưởng.*

**Người phản biện: GS. TS. Vũ Mạnh Hải**

**Ngày nhận bài: 27/8/2018**

**Ngày thông qua phản biện: 27/9/2018**

**Ngày duyệt đăng: 3/10/2018**