

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG BỆNH SÁN DÂY Ở GÀ TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Dương Thị Hồng Duyên, Phạm Diệu Thùy, Nguyễn Hữu Hòa

TÓM TẮT

Trong 500 mẫu phân gà kiểm tra có 30,60% mẫu nhiễm sán dây, 13,73% mẫu nhiễm ở cường độ nặng. Tỷ lệ và cường độ nhiễm sán dây tăng dần theo tuổi gà. Ở mùa hè và mùa thu gà nhiễm sán dây nhiều và nặng hơn ở mùa xuân và mùa đông. Tính biệt ảnh hưởng không rõ rệt đến tỷ lệ và cường độ nhiễm sán dây ở gà. 16,34% gà nhiễm sán dây có triệu chứng lâm sàng. Các triệu chứng lâm sàng chủ yếu của gà bị bệnh sán dây là: gày yếu, sã cánh, lông dựng, mào và tích nhọn nhạt, phân loãng, có nhiều đốt sán.

Từ khóa: *Gà, sán dây, tỷ lệ nhiễm, cường độ nhiễm, triệu chứng, TP. Thái Nguyên.*

Người phản biện: PGS.TS. Cù Hữu Phú

Ngày nhận bài: 20/8/2018

Ngày thông qua phản biện: 20/9/2018

Ngày duyệt đăng: 27/9/2018