

TÌNH HÌNH CHỨNG TĂNG HUYẾT ÁP TRÊN CHÓ MẮC BỆNH TIỂU ĐƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ

Đặng Thị Thắm, Trần Ngọc Bích

TÓM TẮT

Xác định chứng tăng huyết áp trên chó mắc bệnh tiểu đường được tiến hành bằng phương pháp nghiên cứu cắt ngang trên 2.237 chó tại thành phố Cần Thơ. Chẩn đoán tăng huyết áp trên chó mắc bệnh tiểu đường được dựa theo tiêu chuẩn của ACVIM và JVIM (2007). Thông qua chẩn đoán sơ bộ, đo đường huyết và đo huyết áp đã phát hiện 169 ca tăng huyết áp, chiếm tỷ lệ 7,55%. Chứng tăng huyết áp trên chó bị tiểu đường phụ thuộc hoàn toàn và tăng dần theo độ tuổi ($P<0,01$), tính biệt ($P<0,01$) và phương thức nuôi ($P<0,01$), tuy nhiên không phụ thuộc vào yếu tố giống ($P>0,05$). Thuốc điều trị huyết áp propranolol và losartan có hiệu quả điều trị như nhau và hiệu quả điều chỉnh huyết áp về mức bình thường còn thấp.

Từ khóa: *Tăng huyết áp, chó, bệnh tiểu đường.*

Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh

Ngày nhận bài: 14/9/2018

Ngày thông qua phản biện: 15/10/2018

Ngày duyệt đăng: 22/10/2018